

<b>Risiko- klasse</b>	<b>Risikodefinition (anhand von Risikozuständen und unterschiedlichen Indikationen)</b>	<b>Scorepunkte (W.A.R.)</b>
Klasse 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) erworbene immunsuppressive Erkrankung (z.B. Diabetes mellitus)</li> <li>b) erworbener Immundefekt durch medikamentöse Therapie wie Ciclosporin, Methotrexat, Glukokortikoide, Antikörper</li> <li>c) Erkrankung mit soliden Tumoren</li> <li>d) Hämatologische Systemerkrankung</li> <li>e) postchirurgische Wundheilungsstörung, welche zu (ungeplanter) Sekundärheilung führt</li> <li>f) durch Lokalisation besonders keimbelastete Wunden (z.B. Perineum, Genitale)</li> <li>g) problematische hygienische Bedingungen durch soziales oder berufliches Umfeld (z.B. Landwirt, Lkw-Fahrer)</li> <li>h) Lebensalter des Patienten &gt; 80 Jahre</li> <li>i) geringes Lebensalter des Patienten (Frühgeborene, Babies, Kleinkinder)</li> <li>j) Bestandsdauer der Wunde &gt; 1 Jahr</li> <li>k) Wundgröße &gt; 10 cm<sup>2</sup></li> <li>l) chronische Wunden aller Kausalitäten mit einer Tiefe &gt; 1,5 cm</li> <li>m) stationärer Langzeitaufenthalt des Patienten &gt; 3 Wochen</li> </ul>	<b>1</b> <b>Risikopunkt</b>
Klasse 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) schwere erworbene Immundefekte (z.B. HIV-Infektion)</li> <li>b) stark verschmutzte Akutwunden</li> <li>c) Biss-, Stich- und Schusswunden zwischen 1,5 und 3,5 cm Tiefe</li> </ul>	<b>2</b> <b>Risikopunkte</b>
Klasse 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Verbrennungswunden mit Beteiligung von &gt; 15 % KOF</li> <li>b) Wunden, welche eine direkte Verbindung zu Organen oder Funktionsstrukturen aufweisen (z.B. auch Gelenke) bzw. körperfremdes Material enthalten</li> <li>c) schwerste angeborene Immundefekte wie beispielsweise Agammaglobulinämie, schwere kombinierte Immundefekte (SCID), etc.</li> <li>d) Biss-, Stich- und Schusswunden &gt; 3,5 cm Tiefe</li> </ul>	<b>3</b> <b>Risikopunkte</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erreger-Eradikation bei Nachweis von multiresistenten Erregern gemäß Vorgaben des RKI</li> <li>2. Kritisch-kolonisierte Wunden</li> </ul>	<b>Antimikrobielle Behandlung obligat</b>
<p>Die Risikopunkte sind anschließend zu summieren. Ein <b>Score <math>\geq</math> 3 Punkte</b> bedeutet das Vorliegen einer aus klinischer Sicht infektgefährdeten Wunde und bedingt somit die klinische Indikation zur Anwendung lokaler Antiseptika.</p>		

Tab. 1: Risikoeinteilung zu infektgefährdeten Wunden (Wounds At Risk)